ANNEXE IV

MESURE DE LA TAILLE D'UN ORGANISME MARIN

1. La taille des poissons est mesurée, comme illustré à la figure 1, de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.

2. La taille des langoustines (*Nephrops norvegicus*) est mesurée, comme illustré à la figure 2:

   — soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique),

   — soit de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae (longueur totale).

   Dans le cas des queues de langoustines détachées: à partir du bord antérieur du premier segment trouvé sur la queue jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae. Cette mesure est faite à plat, sans étirement et sur la face dorsale.

3. La taille des homards (*Homarus gammarus*) provenant de la mer du Nord, excepté le Skagerrak ou le Kattegat, est mesurée, comme illustré à la figure 3, parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothorax (longueur céphalothoracique).

4. La taille des homards (*Homarus gammarus*) provenant du Skagerrak ou du Kattegat est mesurée, comme illustré à la figure 3:

   — soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique),

   — soit de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae (longueur totale).

5. La taille des langoustes (*Palinurus* spp.) est mesurée, comme illustré à la figure 4, parallèlement à la ligne médiane, de la pointe du rostre jusqu'au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique).

6. La taille des mollusques bivalves correspond, comme illustré à la figure 5, à la plus grande dimension de la coquille.

7. La taille des araignées de mer (*Maja squinado*) est mesurée, comme illustré à la figure 6, le long de la ligne médiane à partir du bord du céphalothorax entre les rostres jusqu'au bord postérieur du céphalothorax (longueur céphalothoracique).

8. La taille des tourteaux (*Cancer pagurus*) est la largeur maximale de la carapace mesurée, comme illustré à la figure 7, perpendiculairement à la ligne médiane antéropostérieure de la carapace.

9. La taille des buccins (*Buccinum* spp.) est la longueur de la coquille mesurée comme illustré à la figure 8.

10. La taille des espadons (*Xiphias gladius*) est la longueur maxillaire inférieur-fourche inférieure mesurée comme illustré à la figure 9.

Figure 1 Espèces de poisson



Figure 2 Langoustine
(*Nephrops norvegicus*)



Figure 3 Homard

(*Homarus gammarus*)



Figure 4 Langoustes

(*Palinurus* spp.)



Figure 5 Mollusques bivalves

Figure 6 Araignée de mer

(*Maja squinado*)



Figure 7 Tourteau

(*Cancer pagurus*)



Figure 8 Buccins

(*Buccinum* spp.)



Figure 9 Espadon

(*Xiphias gladius*)