

ANNEXE IV

Coefficients de conversion à utiliser pour le remplissage du journal de bord, de la déclaration de débarquement et du document électronique de capture du thon rouge (eBCD)

Facteurs de conversion pour le thon rouge (Thunnus thynnus) adoptés par le comité permanent de la recherche et des statistiques de l'ICCAT s'appliquant au calcul de l'équivalent poids arrondi du thon rouge transformé.

Espèce (spp): thon rouge (BFT)

Provenance	Coefficients de conversion (1)	Références (2)
Élevage	RWT = 1.00xBM	ANON. (2003)
Sauvage	RWT = 10.28xBM	ANON. (2003)
Toutes provenances	RWT = 1.25xDWT	ANON. (2003)
Toutes provenances	RWT = 1.67xFIL	ANON. (2003)
Toutes provenances	RWT = 1.16xGWT	INCONNUE
Toutes provenances	RWT = 2.00xOT	ANON. (2003)
Méditerranée	RWT = 1.13xGWT	ANON. (1993)

(1) Types de présentations:

BM = (belly meat), chair de l'abdomen

DWT = (dressed weight), poids paré (éviscéré, étêté, sans branchie et nageoires coupées)

FIL = (fillet weight), poids fileté

GWT = (gilled and gutted), éviscéré et sans branchie

OT = (other), autre présentation

RWT = (round weight), poids arrondi (toutes les statistiques de capture sont établies en poids arrondi).

(2) Références :

ANONYME, Rapport de la seconde consultation d'experts GFCM-ICCAT sur les stocks de grands pélagiques en Méditerranée, (1993). Col. Vol. Sci. Pap. ICCAT, 40(1) : 11-35

ANONYME, Rapport de la sixième réunion d'experts GFCM-ICCAT sur les stocks de grands pélagiques en Méditerranée, (1993). Col. Vol. Sci. Pap. ICCAT, 55(1) : 1-84

Source : ICCAT , mise à jour : 19 septembre 2006